



CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II ALTAMENTE TÓXICO

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Dimetoato:400 g/l
 O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
 Ingredientes Aditivosc.s.p..... 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO:

SISTOATO 40 EC, es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión contra áfidos y pulgones.

SISTOATO 40 EC, es absorbido rápidamente por la planta, aún en condiciones atmosféricas desfavorables. Es de acción residual, protegiendo los brotes de las plantas que se desarrollan después del tratamiento, pero, no se acumula en el suelo, durando su efecto en el mismo entre 3 a 4 días.

SISTOATO 40 EC, es tóxico a las abejas, por lo que no deberá usarse en período de floración.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS L/ Ha |
|---------|--|-------------|
| Papa | Afidos, pulgones (<i>Mizus persicae</i>) | 0,5 |
| Arroz | Chinche de la espiga (<i>Oebalus insularis</i>) | 1,5 |
| Cebolla | Thrips (<i>Thrips sp</i>) Tostón (<i>Liriomyza huiodobrensis</i>) | 0,3 – 0,6 |

COMPATIBILIDAD, Es recomendable realizar una prueba a pequeña escala antes de hacer la mezcla con otros productos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

SEMBRAMOS FUTURO...

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS L/ Ha |
|---------------------|--|--|
| Tomate y Tabaco | Minador (<i>Phthorimea operculella</i>) | 0,75– 1.25 |
| | Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Afidos (<i>Aphis sp, Myzus sativae.</i>) Cucarroncitos del follaje (<i>Epitrix sp, Diabrotica spp, Cerotoma spp</i>) Minador de las hojas (<i>Liriomyza munda</i>) | 0,25– 0,50 |
| Cítricos y Frutales | Afidos (<i>Torxoptera citricidus, aphid spiraecola</i>) Piojos blancos (<i>Unaspis citri</i>) Escamas (<i>Selenaspidus articulatus</i>) | 0,1 –0,12 cc/100 l de agua |
| | Chinche hediondo (<i>Antiteuchus articulatus</i>), <i>Antiteuchus pallescens</i>) Minadores (<i>Coccus viridis, Selenaspidium articulatus, Saissetis ceffae</i>) | 375 cc/100 L de agua. Agregar aceite al 2%. 250 cc/100 L de agua |
| Frijol | Lorito verde (<i>Empoasca sp.</i>) | 0.4 – 0.75 |
| Soya | Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) | 0.5 – 1.0 |

EQUIPOS Y VOLUMEN DE APLICACION:

SISTOATO 40 EC, se puede aplicar con los equipos convencionales que posean boquilla TX 1, TX 2, TX 6 o equivalentes. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua.

Agregue lentamente la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación.

PRESENTACIONES:

Por 1 Litro.



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
 Av. Cra. 20 # 80 – 60 Ofc. 302
 Tel: 634 8391 / 92 / 93
 Bogotá D.C.
 Colombia